



Boîte de secours de l'unité de travail

La boîte de secours doit être résistante aux chocs, étanche à la poussière et facilement transportable.

Il faut :

- conserver les produits à l'abri de la chaleur et de la lumière,
- remplacer systématiquement les articles utilisés ou périmés.



Non consommables

- 1 coussin hémostatique
- 1 couverture isothermique
- 2 poches de récupération de membres sectionnés
- 1 masque de protection bouche à bouche
- 1 paire de ciseaux en acier inoxydable à bouts ronds
- 1 pince à échardes à bouts pointus
- 10 épingles de sûreté à boule
- 1 garrot (type garrot tourniquet) *

Consommables

- 10 gants en vinyle à usage unique
- 30 pansements auto-adhésifs (sous conditionnement individuel)
- 2 boîtes de 10 compresses stériles individuelles 30 x 30
- 1 kit de bandes dans un sac Minigrip :
 - 3 bandes extensibles (3 m x 7 cm)
 - 3 bandes extensibles (3 m x 10 cm)
 - 1 bande crêpe (4 m x 10 cm)
- 1 rouleau de sparadrap anallergique (5 m x 2 cm)
- 1 écharpe triangulaire
- 5 sachets unitaires de pansements gras (10 x 10 cm)
- 10 dosettes de Chlorhexidine aqueuse stériles
- 10 dosettes de sérum physiologique
- 1 boîte de Coalgan
- 12 serviettes imprégnées au calendula
- 1 tube de gel d'arnica
- 1 sac pour récupération des déchets



Emploi des produits de pharmacie par le secouriste du travail

Contusion sans plaie

- Appliquer de l'arnica* et immobiliser le membre.
- Adresser chez le médecin.

Plaie simple

- Désinfecter la plaie.
- Pansement.
- Protection antitétanique par le médecin dans les 12 heures, sauf vaccination à jour.

Brûlure thermique simple

- Refroidir immédiatement avec de l'eau à faible pression et à distance de la lésion jusqu'à l'arrivée des secours.
- Appliquer le pansement gras.
- Pansement.
- Adresser chez le médecin pour soins complémentaires et surveillance.

Corps étranger dans l'oeil

- Laver sous faible pression au sérum physiologique*.
- Adresser chez un médecin ophtalmologiste (spécialiste des yeux).
- En cas de projection irritante ou contaminante, laver abondamment les deux yeux au sérum physiologique* et adresser chez l'ophtalmologiste.

Saignement

- Faire comprimer ou comprimer l'endroit qui saigne.
- Mettre en place un pansement compressif.
- Mettre en place un garrot si la compression manuelle est impossible ou inefficace.
- En cas de saignement de nez : moucher, compresser et insérer une mèche de Coalgan* dans le nez, tête penchée en avant.